**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement/votre maladie.**
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après une semaine, consultez un médecin.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que XERUMENEX et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser XERUMENEX ?
3. Comment utiliser XERUMENEX ?
4. Les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver XERUMENEX ?
6. Informations supplémentaires.

# XERUMENEX, solution pour instillation auriculaire

(Oleyl polypeptide)

- La substance active est l'oleyl polypeptide.
- Les autres composants (excipients) sont : tromethamine – propylène glycol.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :
Meda Pharma s.a. – Chaussée de la Hulpe 166 - 1170 Bruxelles
Fabricant : Sanico – 2300 Turnhout
Numéro de l'autorisation de mise sur le marché : 616 S 476 F 11

## 1. Qu'est ce que XERUMENEX et dans quel cas est-il utilisé ?

Solution pour instillation auriculaire – Flacon de 8 ml
Groupe pharmacothérapeutique : contient de l'oleyl polypeptide qui dissout le bouchon de cire de l'oreille.
Indications thérapeutiques :
- élimination sans douleur des bouchons de cire dans l'oreille.
- nettoyage de l'oreille externe avant examen médical.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser XERUMENEX ?

N'utilisez pas XERUMENEX :
- si vous êtes hypersensible (allergique) à la substance active ou à l'un des autres composants.
- en cas de perforation du tympan, d'inflammation de l'oreille moyenne et d'otite.

Faites attention :
- à ne pas avaler XERUMENEX, ni le mélanger avec un autre médicament ou produit pour les oreilles.
- à respecter soigneusement la dose et le mode d'emploi recommandés. En particulier, ne pas dépasser les 30 minutes d'application.
- à éviter le contact du liquide d'écoulement avec la peau autour de l'oreille : sinon, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Utilisation de XERUMENEX en association avec d'autres médicaments".

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Utilisation de XERUMENEX en association avec des aliments ou des boissons

sans objet

Grossesse

Chez la femme enceinte, XERUMENEX ne sera utilisé que sur avis médical.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Pendant la période d'allaitement, XERUMENEX ne sera utilisé que sur avis médical.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines

sans objet

Utilisation de XERUMENEX en association avec d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments sans ordonnance.

## 3. Comment utiliser XERUMENEX ?

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Se coucher sur l'oreille non affectée.
Mettre 3 à 5 gouttes de XERUMENEX ou la dose prescrite par le médecin dans le conduit de l'oreille à traiter et fermer par un bouchon d'ouate.
Attendre 20 à 30 minutes, puis rincer prudemment avec de l'eau tiède à l'aide d'une poire en caoutchouc.

Une deuxième application peut parfois être nécessaire : la répéter avec prudence. En l'absence de résultat, faire appel au médecin.

Si vous avez pris plus de XERUMENEX que vous n'auriez dû :

Si vous avez utilisé trop de XERUMENEX, arrêtez le traitement et consultez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070/245 245).

En cas d'allergie, faire appel au médecin pour un traitement approprié.
L'ingestion accidentelle par la bouche pourrait entraîner une irritation des muqueuses de la bouche et du pharynx.
Traitement : rincer abondamment à l'eau, prendre un calmant et consulter le médecin.

## 4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, XERUMENEX peut avoir des effets indésirables.
Chez certains patients sensibles, il peut entraîner une allergie au niveau du conduit et de la peau autour de l'oreille : rougeur, gonflement, vésicules, eczéma.
Autres réactions rapportées chez des patients traités par XERUMENEX : dermatite de contact allergique, sensation de brûlure et douleur au site d'application et rash.
En cas d'effet non désiré, arrêter le traitement et consulter le médecin.

Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. Comment conserver XERUMENEX ?

Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
Conserver à température ambiante (15-25°C)

Date de péremption : n'utilisez plus XERUMENEX après la date de péremption figurant sur l'emballage après la mention "EX"

## 6. Informations supplémentaires

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament.

Mode de délivrance : délivré en pharmacie sans ordonnance

La dernière mise à jour de cette notice date de février 2006.

Under licence from MUNDIPHARMA, Basel/Switzerland